

- Martes 15 de Abril -

## Usuarios registrados

### Usuario:

### Password:

- ¿Olvidó su contraseña?
- Política de privacidad

REGISTRARSE

## Carpetas

A - B - C - D - E - F  
G - H - I - J - K - L  
M - N - O - P - Q - R  
S - T - U - V - W - X  
Y - Z

¡Cambie al formato digital ahora!



Zinio España



## Nota de prensa



email al comunicador



ver carpeta de prensa

### BioRegió de Catalunya

14-04-08 // 17:02h

## El paracetamol tomado durante el embarazo aumenta el riesgo de asma en recién nacidos

Según publica la revista *International Journal of Epidemiology* del pasado viernes 11 de abril.

**Barcelona, 14 de abril de 2008-** Un trabajo internacional realizado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y por el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), con la colaboración de la University of Aarhus de Dinamarca, **pone de manifiesto la relación existente entre la utilización de paracetamol durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre de gestación y, el riesgo de que los niños sufran problemas respiratorios o desarrollen asma a lo largo de los primeros siete años de vida.**

Estos resultados son especialmente relevantes si se tiene en cuenta que el paracetamol es un analgésico ampliamente utilizado por la población en general, y que es a menudo el fármaco de elección para paliar el dolor en mujeres embarazadas, ya que no está contraindicado durante la gestación. Hasta el momento, el uso de paracetamol ya había estado asociado con un incremento del asma en niños y adultos, pero no se había realizado un estudio de amplio alcance que relacionara este efecto en la exposición prenatal. **Los resultados revelan un incremento del 20% del riesgo que los niños sufran asma durante los primeros 18 meses de vida, riesgo que se incrementa hasta el 50% si el estudio se amplía a los siete años.**

Para la realización del estudio los investigadores hicieron un **seguimiento a 66.445 mujeres, provenientes de la Danish National Birth Cohort**, una base de datos que incluye información de los nacimientos desde 1996 al 2003. Se obtuvo información relativa a la toma, durante la gestación, de paracetamol y otros fármacos hasta una lista de 44 analgésicos disponibles en Dinamarca. En el momento en que sus hijos tuvieron 18 meses, estas mismas madres consintieron participar en una entrevista para saber que recién nacidos habían estado diagnosticados de asma y/o habían desarrollado problemas respiratorios y quienes no y, de estos, 12.733 estuvieron disponibles años después para dar la misma información cuando sus hijos tuvieron 7 años. La muestra se amplió aún más al poder acceder a los registros de niños hospitalizados a causa de asma, menores de 18 meses, en el Hospital Nacional de Dinamarca. Según Manolis Kogevinas, investigador del estudio: **"Se han podido poner de manifiesto por primera vez con suficiente evidencia científica los efectos para el feto del paracetamol tomado en cualquier momento del embarazo, ya que el paracetamol atraviesa la placenta y el feto tiene una capacidad de metabolizarlo diferente del adulto"**. Este estudio prospectivo parece confirmar la hipótesis de que el asma infantil puede iniciarse ya en el útero, es decir, en la etapa prenatal. Los investigadores concluyen que es necesario seguir investigando los posibles efectos adversos relacionados con el uso de paracetamol durante el embarazo, poniendo especial énfasis en la duración de los efectos y en la importancia de la combinación de la exposición prenatal y postnatal. No obstante, y dada la alta

## Notas de prensa

15-04-08 // 02:01h  
Manos y pies de estrella con los cuidados de NAILS BAR

[EPComunicación](#)

14-04-08 // 16:56h  
El paracetamol pres durant l'embaras augmenta el risc d'asma en nadons  
[BioRegió de Catalunya](#)

14-04-08 // 16:41h  
Noves indicacions per a la cirurgia dels trastorns del moviment  
[BioRegió de Catalunya](#)

14-04-08 // 16:37h  
Nuevas indicaciones para la cirugía de los trastornos del movimiento  
[BioRegió de Catalunya](#)

14-04-08 // 16:21h  
LOS XII TALLERES DE CAMFIC PREPARARÁN A LOS MÉDICOS DE FAMILIA PARA AFRONTAR NUEVAS TÉCNICAS Y SITUACIONES EN CONSULTA  
[BioRegió de Catalunya](#)

14-04-08 // 15:46h  
ED753 – Sonda Transmisora de presión compacta y sumergible a una excelente relación calidad-precio  
[Blanz Marketing & PR, S.L](#)

prevalencia del asma infantil en nuestra sociedad, es importante tener en cuenta estos resultados para revisar la práctica prescriptiva del paracetamol durante el periodo de gestación.

**Trabajo de referencia:**

"Pre-natal exposure to paracetamol and risk of wheezing and asthma in children: A birth cohort study". International Journal of Epidemiology 2008; 1-8. Doi: 10.1093/ije/dyn070

**Para más información contactar con:**

Rosa Manaut, responsable de Comunicación Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), Telf: 618509885 o Marta Calsina, Servicio de Comunicación Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), Telf: 933160680 o 638720000

Más información en: <http://www.biocat.cat>

No hay archivos adjuntos



email al comunicador



carpeta de prensa

14-04-08 // 15:37h  
Las "buenas prácticas" en las organizaciones son un compromiso de tod@s

[Alma Social](#)

14-04-08 // 12:34h  
COMUNICADO DE FARMAINDUSTRIA ANTE LA COMPOSICION DEL NUEVO EJECUTIVO FARMAINDUSTRIA



11-04-08 // 16:29h  
El Clínic posa en marxa el projecte de nou edifici en els terrenys de la Caserna de Bombers

[BioRegió de Catalunya](#)

11-04-08 // 12:03h  
L'Hospital Josep Trueta arriba a les cent primeres intervencions a cor obert, resoltes totes amb èxit

[BioRegió de Catalunya](#)

[+ Más notas](#)